

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України  
14.12.12 № 1048

Реєстраційне посвідчення  
№ МД/10020/03/01

**I Н С Т Р У К Ц І Я**  
для медичного застосування препарату

**ЦЕЛЬ Т**  
(ZEEL® T)

**Склад лікарського засобу:**

*діючі речовини:* 100 г препарату містять: Acidum silicum D6 – 1 г, Acidum thiocticum D6 – 0,01 г, Arnica montana D2 – 0,3 г, Cartilago suis D2 – 0,001 г, Coenzym A D6 – 0,01 г, Embryo totalis suis D2 – 0,001 г, Funiculus umbilicalis suis D2 – 0,001 г, Nadidum D6 – 0,01 г, Natrium diethyloxalaceticum D6 – 0,01 г, Placenta totalis suis D2 – 0,001 г, Rhus toxicodendron D2 – 0,27 г, Sanguinaria canadensis D2 – 0,225 г, Solanum dulcamara D2 – 0,075 г, Sulfur D6 – 0,27 г, Symphytum officinale D8 – 0,75 г;

*допоміжні речовини:* спирт цетостеариловий (тип А) емульгований, етанол 96 %, олія мінеральна, парафін білий м'який, вода очищена.

**Лікарська форма.** Мазь.

М'яка мазь від білого до жовто-білого кольору з незгіркливим запахом.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

Біологіше Хайліміттель Хеель ГмбХ.

Д-р Рекевег-штрасе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/  
Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

Препарат чинить протизапальну, аналгетичну, хондропротекторну, регенеруючу дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу препарату.

**Показання для застосування.**

Артрози (гонартрози, поліартрози, спондилоартрози), плечолопатковий періартрит, тендопатії.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до рослин родини складноцвітих (у т.ч. *Arnica*), родини плюща отруйного або до інших компонентів препарату.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Мазь слід наносити тільки на неушкоджену шкіру.

Якщо симптоми не зникають чи стан пацієнта погіршується, необхідно проконсультуватися з лікарем.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.* Не застосовують.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.* Не впливає.

**Діти.** Препарат рекомендований для застосування дітям віком від 6 років.

**Спосіб застосування та дози.**

Дорослим і дітям віком від 6 років наносити 4-5 см мазі на шкіру в ділянках уражених суглобів та сухожиль та втирати легкими рухами 2-5 разів на добу.

Курс лікування – 3-6 тижнів.

**Передозування.**

Не відзначалося.

**Побічні ефекти.**

У дуже поодиноких випадках можуть спостерігатися реакції гіперчутливості або місцеві алергічні шкірні реакції, у випадку яких застосування препарату необхідно припинити. Цетостеариловий спирт може спричинити місцеві шкірні реакції (контактний дерматит).

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Сумісний з іншими лікарськими засобами місцевої та загальної дії.

**Термін придатності.** 3 роки.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

50 г у тубі у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецептa.

**Дата останнього перегляду.**

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного досьє та достовірно  
відомими даними щодо застосування  
лікарського засобу