

## **СКЛАД І ФОРМА ВИПУСКУ**

### **спрей назальний флакон 20 мл, № 1**

*Склад:* манітол, гліцерин, дикалію гліцирризинат, сополімер PEG/PPG, EDTA динатрієва сіль, N-гідроксиметилгліцинат, полісорбат 20, калію сорбат, натрію гідроксид, вода очищена, натуральні ароматизатори..

№ PR.143-19 від 04.02.2019 до 03.02.2024

## **ДІАГНОЗИ**

## **ХАРАКТЕРИСТИКА**

Нарівент — медичний виріб з осмотичною дією, протинабряковим та флоголітичним ефектом.

Нарівент показаний для:

- зняття назальної обструкції, що викликана гіпертрофією носових раковин та специфічним (алергічним) або неспецифічним вазомоторним ринітом;
- лікування набряку, пов'язаного з гострими та хронічними риносинуситами та аденоїдитами;
- лікування та профілактики післяопераційного рецидиву носових поліпів;
- до- та після операційного лікування патологій носа та приносних пазух.

## **РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ**

зніміть захисний ковпачок. Покладіть великий палець на основу пляшки, вказівним та середнім пальцем натисніть на клапани дозатора і потім відпустіть їх.

Операцію слід повторити до появи спрею.

Злегка нахиліть голову вперед та вприскуйте спрей в ніздрю, не вдихаючи його під час вприскування.

При проведенні дохірургічної терапії медичний виріб призначають пацієнту лише за відсутності гіперчутливості чи непереносимості продукту.

Дорослим та дітям рекомендовано по 2 вприскування в кожную ніздрю 2 рази на день, або за призначенням лікаря.

## **ПОБІЧНА ДІЯ**

немає даних про побічні ефекти, пов'язані з використанням медичного виробу.

## **ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ**

Продукт може викликати тимчасове легке відчуття носового свербіння і легкого чхання під час першого застосування.

Специфічний механізм дії медичного виробу Нарівент спрей може викликати тимчасову перехідну осмотичну ринорею після його застосування.

У випадку застосування на доопераційному етапі слід встановити відсутність у пацієнта гіперчутливості чи непереносимості до медичного виробу.

Не використовувати при наявності гіперчутливості до будь-якого компонента медичного виробу.

У випадку появи побічних реакцій, використання медичного виробу слід припинити і звернутися до лікаря.

Не допускати потрапляння в очі.

Слід щільно закривати контейнер після його застосування.

Не використовувати медичний виріб після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Тримати подалі від джерел тепла, а також в недоступних для дітей місці.

Медичний виріб призначений для індивідуального використання.

Не ковтати.

Не викидати контейнер після його використання в навколишнє середовище (з метою уникнення забруднення довкілля).

## **УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ**

при температурі не вище 30°C.

## **ІНСТРУКЦІЯ МОЗ**

### **НАРІВЕНТ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ ПРОТИНАБРЯКОВИЙ спрей назальний**

## ІНСТРУКЦІЯ

### для використання медичного виробу

#### Показання до застосування:

НАРІВЕНТ - медичний виріб з осмотичною дією, протинабряковим та флоголітичним ефектом.

НАРІВЕНТ показаний для:

- зняття назальної обструкції, що викликана гіпертрофією носових раковин та специфічним (алергічним) або неспецифічним вазомоторним ринітом;
- лікування набряку, пов'язаного з гострими та хронічними риносинуситами та аденоїдитами;
- лікування та профілактики післяопераційного рецидиву носових поліпів;
- до- та післяопераційного лікування патологій носа та приносових пазух.

#### Склад:

Манітол, гліцерин, дикалію гліцирризинат, сополімер PEG/PPG, EDTA динатрієва сіль, N-гідроксиметилгліцинат, полісорбат 20, калію сорбат, натрію гідроксид, вода очищена, натуральні ароматизатори.

#### Спосіб застосування:

Зніміть захисний ковпачок. Покладіть великий палець на основу пляшки, вказівним та середнім пальцем натисніть на клапани дозатора і відпустіть їх.

Операцію слід повторити до появи спрею.

Злегка нахиліть голову вперед та вприскуйте спрей в ніздрю, не вдихаючи його під час вприскування.

При проведенні дохірургічної терапії медичний виріб призначають пацієнту лише за відсутності гіперчутливості чи непереносимості продукту.

Дорослим та дітям рекомендовано по 2 вприскування в кожную ніздрю 2 рази на день, або за призначенням лікаря.

#### Побічні ефекти:

Немає даних про побічні ефекти, пов'язані з використанням медичного виробу.

**Застереження:**

- Продукт може викликати тимчасове легке відчуття носового свербіння і легкого чхання під час першого застосування.
- Специфічний механізм дії медичного виробу НАРІВЕНТ спрей може викликати тимчасову перехідну осмотичну ринорею після його застосування.
- У випадку застосування на доопераційному етапі слід встановити відсутність у пацієнта гіперчутливості чи непереносимості до медичного виробу.
- Не використовувати при наявності гіперчутливості до будь-якого компонента медичного виробу.
- У випадку появи побічних реакцій використання медичного виробу слід припинити і звернутися до лікаря.
- Не допускати потрапляння в очі.
- Слід щільно закривати медичний виріб після його застосування.
- Не використовувати медичний виріб після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
- Тримати подалі від джерел тепла, а також в недоступному для дітей місці.
- Медичний виріб призначений для індивідуального використання.
- Не ковтати.
- Не викидати контейнер після його використання в навколишнє середовище (з метою уникнення забруднення довкілля).

**Дата останнього перегляду.**

14.11.2018.

**Уповноважений представник:**

ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД».

Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139.

**Виробник:**

DMG Italia S.r.l

Via Laurentina, Km, 26,700 - Pomezia - Rome - ITALIA

[www.dmgit.com](http://www.dmgit.com)