

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

фармакодинамика. Противовирусное средство, специфически подавляет вирусы гриппа А и В, включая высокопатогенные подтипы А (H1N1) pdm09 и А (H5N1). По механизму противовирусного действия относится к ингибиторам слияния (фузии), взаимодействует с гемагглютинином вируса и препятствует слиянию липидной оболочки вируса и клеточных мембран.

Терапевтическая эффективность при гриппе проявляется в уменьшении продолжительности и тяжести течения болезни и ее основных симптомов, а также в снижении частоты развития осложнений, связанных с гриппом.

Лекарственное средство относится к малотоксичным препаратам, не оказывает негативного влияния на организм человека при применении в рекомендованных дозах.

Фармакокинетика. Препарат быстро всасывается в пищеварительном тракте. Стах в плазме крови достигается при приеме в дозе 50 мг через 1,2 ч, в дозе 100 мг — через 1,5 ч после приема. T_{1/2} составляет 17–21 ч. Около 40% препарата выводится в неизменном виде: с калом (38,9%) и мочой (0,12%). В течение первых суток выводится 90% принятой дозы.

ПОКАЗАНИЯ

профилактика и лечение гриппа А и В.

ПРИМЕНЕНИЕ

применять взрослым. Принимать внутрь до приема пищи. Разовая доза составляет 200 мг.

Для профилактики:

при непосредственном контакте с больными гриппом: по 200 мг 1 раз в сутки в течение 10–14 дней;

в период эпидемии гриппа: по 200 мг 2 раза в неделю в течение 3 нед.

Для лечения гриппа: по 200 мг 4 раза в сутки (каждые 6 ч) в течение 5 дней.

Максимальная суточная доза составляет 800 мг.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

нарушения со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, в том числе покраснение кожи, зуд, сыпь, крапивница, ангионевротический отек.

Изменения со стороны ЖКТ, включая изжогу, ощущение тяжести в эпигастральной области, рвота.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения в период беременности и кормления грудью изучена недостаточно.

Дети. Не применять у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В рекомендованных дозах не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

при взаимодействии препарата с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

не отмечена.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.