

ИНСТРУКЦИЯ для медицинского применения препарата

КОЛИКИД®

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: simeticone;

1 таблетка содержит симетикона 125 мг;

вспомогательные вещества: магния-алюминия силикат, лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, кальция гидрофосфат, кислота стеариновая, кремния диоксид коллоидный безводный, кросповидон, повидон К 29/32; покрытие Opadry II 85G 52218 Yellow.

Лекарственная форма. Таблетки, покрытые оболочкой.

Овальные, гладкие с обеих сторон таблетки, покрытые оболочкой желтого цвета.

Название и месторасположение производителя.

ООО «КУСУМ ФАРМ».

Украина, 40030, г. Сумы, ул. Скрябина, 54.

Фармакотерапевтическая группа.

Другие препараты для лечения функциональных расстройств кишечника. Силиконы.

Код АТС А03А Х13.

Коликид® – это препарат, который уменьшает газообразование в кишечнике. Активный компонент препарата – симетикон – инертное поверхностно-активное вещество, которое устраняет пузырьки газа в кишечнике при метеоризме, уменьшая их поверхностное натяжение. Газы, которые высвобождаются при этом, могут как поглощаться стенками кишечника, так и выводиться из организма благодаря перистальтике кишечника. Симетикон не абсорбируется в пищеварительном тракте, выводится транзитом. Применение препарата Коликид® до начала диагностических исследований предупреждает возникновение дефектов изображения, которые возникают из-за пузырьков газа; оказывает содействие тщательному орошению слизистой оболочки толстой кишки контрастным веществом, что предотвращает разрыв контрастной пленки даже в случае вздутия кишечника.

Коликид® не имеет центрального действия.

Показания к применению.

Симптоматическое лечение метеоризма (в том числе в послеоперационный период); применяется как вспомогательное средство для подготовки к диагностическому исследованию органов брюшной полости (рентгенологическое исследование, УЗИ, гастроскопия и т. п.); отравление моющими средствами.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату и его компонентам.

Кишечная непроходимость, обструктивные заболевания пищеварительного тракта.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Нет данных относительно вероятной экскреции препарата в грудное молоко.

Применение препарата Коликид® в период беременности или кормления грудью возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Не влияет.

Дети.

Коликид® таблетки применяют детям возрастом от 12 лет.

Детям до 12 лет препарат назначают в виде жидких лекарственных форм.

Способ применения и дозы.

При метеоризме детям возрастом от 12 лет и взрослым назначают по 1 таблетке 3 раза в сутки. С целью подготовки к диагностическим исследованиям назначают по 1 таблетке 3 раза в сутки за день до исследования и еще 1 таблетку утром в день его проведения. Таблетки Коликид® принимают во время или после еды. Продолжительность курса лечения устанавливается индивидуально. При необходимости препарат можно принимать длительное время.

Отравление моющими средствами: дозирование зависит от тяжести интоксикации. Минимальная рекомендованная доза – 3 таблетки.

Передозировка.

Неизвестно.

Побочные эффекты.

Аллергические проявления при повышенной чувствительности к препарату или к его компонентам.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Не установлено.

Срок годности.

2 года.

Условия хранения.

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 7 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной упаковке № 14 (7 × 2).

Категория отпуска.

Без рецепта.