

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказ Министерства**  
**здравоохранения Украины**  
**03.02.2012 № 82**  
**Регистрационное удостоверение**  
**№ UA/6033/01/01**

**ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ**  
**Приказ Министерства**  
**здравоохранения Украины**  
**20.01.14 № 55**

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению препарата**

**ХОНДРА-СИЛА**  
**(HONDRA-SYLA)**

**Состав лекарственного средства:**

*действующее вещество:* chondroitin sulfate;

100 г мази содержат хондроитина натрия сульфата 5 г в пересчёте на 100 % вещество;

*вспомогательные вещества:* диметилсульфоксид, ланолин, парафин белый мягкий, вода очищенная.

**Лекарственная форма.**

Мазь.

Мазь бледно-жёлтого цвета со слабым специфическим запахом.

**Название и местонахождение производителя.**

ПАО «Фармак».

Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 63.

**Фармакотерапевтическая группа.**

Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства. Хондроитина сульфат. Код АТС M01A X25.

Хондроитина сульфат оказывает хондропротекторное, хондростимулирующее, регенерирующее, противовоспалительное и обезболивающее действие. Улучшает фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, ингибирует ферменты, нарушающие структуру и функцию суставного хряща, тормозит процессы дегенерации хрящевой ткани. Стимулирует синтез глюкозаминогликанов, нормализует метаболизм гиалиновой хрящевой ткани, способствует регенерации хрящевых поверхностей и суставной сумки. При наружном применении препарат замедляет прогрессирование остеоартроза, уменьшает воспаление и боль в поражённых суставах.

Диметилсульфоксид, который входит в состав препарата, способствует лучшему проникновению хондроитина через кожу.

Фармакокинетика хондроитина сульфата при накожном применении не исследована. При накожной аппликации препарата максимальная его концентрация в плазме крови достигается через 3-4 часа, в синовиальной жидкости – через 4-5 часов после применения. Биодоступность – 13 %. Выводится почками в течение 24 часов.

**Показания к применению.**

Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника (преимущественно локализованные формы): остеоартроз, остеохондроз.



**Противопоказания.**

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата. Тромбофлебит, склонность к кровоточивости, острые воспалительные процессы на участке нанесения препарата.

**Надлежащие меры безопасности при применении.**

Препарат следует наносить только на неповрежденные участки кожи, необходимо избегать попадания препарата на открытые раны, в глаза и на слизистые оболочки.

**Особые предостережения.*****Применение в период беременности или кормления грудью.***

Безопасность и эффективность применения препарата в период беременности или кормления грудью не установлены, поэтому применять препарат можно только в том случае, когда по мнению врача, польза при применении превышает риск.

***Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.*** Не влияет.

***Дети.*** Препарат не следует применять для лечения детей из-за отсутствия достаточного клинического опыта.

**Способ применения и дозы.**

Препарат применяют наружно. Мазь наносить 2–3 раза в сутки тонким слоем на кожу в области поражения, легко втирая до полного всасывания.

Длительность курса лечения определяется индивидуально в зависимости от эффективности и переносимости терапии и, как правило, составляет 2–3 недели. При необходимости курс повторить.

**Передозировка.**

Случаи передозировки не описаны. Возможны случаи гиперчувствительности, которые требуют отмены препарата и проведения симптоматической терапии.

**Побочные эффекты.**

Кожные аллергические реакции: зуд, гиперемия, жжение, сыпь, которые могут возникнуть в местах нанесения.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.** При накожном применении препарата его взаимодействие с другими лекарственными средствами не установлено.

**Срок годности.** 3 года.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения.**

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Упаковка.**

По 30 г в тубе. По 1 тубе в пачке.

**Категория отпуска.** Без рецепта.

**Дата последнего пересмотра.** 20.01.2014.

