

Реєстраційне посвідчення  
№ УА 14245/01/01

**I Н С Т Р У К Ц І Я**  
для медичного застосування препарату  
**РЕСТРУКТА ПРО ІН'ЄКЦІОНЕ С**  
(RESTRUCTA® PRO INJECTIONE S)

**Склад:**

діючі речовини: 2,0 мл розчину містять: Colchicum autumnale D4 – 143 мг, Solidago virgaurea D3 – 83 мг, Berberis vulgaris D4 – 143 мг, Bryonia D4 – 143 мг, Calcium hypophosphorosum D3 – 83 мг, Convallaria majalis D4 – 83 мг, Echinacea D4 – 83 мг, Formica rufa D4 – 83 мг, Formica rufa D6 – 83 мг, Formica rufa D10 – 83 мг, Ferrum phosphoricum D10 – 83 мг, Lithium chloratum D3 – 83 мг, Rhus toxicodendron D4 – 146 мг, Smilax D4 – 143 мг, Salix alba D4 – 143 мг, Coffeinum monohydricum D4 – 83 мг, Cinchona pubescens D4 – 83 мг, Acidum silicicum D8 – 83 мг;

допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

**Лікарська форма.** Розчин для ін'єкцій.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

У складі комплексного лікування сечокислого діатезу, подагри, сечокам'яного діатезу, порушень пуринового обміну, артритів.

**Протипоказання.**

Гіперчутливість до компонентів препарату, складноцвітих рослин (ромашка лікарська, календула лікарська, кульбаба).

Туберкульоз, лейкемія, запальні захворювання сполучних тканин (колагенові хвороби, у т.ч. ревматизм), аутоімунні захворювання, розсіяний склероз, СНІД, ВІЛ інфекції та інші хронічні вірусні захворювання. Новоутворення.

Вагітність або період годування груддю. Дитячий вік до 12 років.

**Способ застосування та дози.**

Разова доза: дорослим і дітям віком від 12 років – 1 ампула по 2 мл. Застосовувати у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних, внутрішньошкірних ін'єкцій, дітям віком від 12 років – у вигляді питних ампул (розчинити разову дозу у 5-10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті) 1-3 рази на тиждень.

Курс лікування – 4-6 тижнів.

**Побічні реакції.**

У поодиноких випадках можуть виникати побічні реакції з боку шлуково-кишкового тракту (нудота, блювання, діарея, біль у животі) або шкірні реакції – у тому числі через кілька днів після застосування. В окремих випадках можуть виникати реакції гіперчутливості.

При застосуванні ліків, приготовлених з ехінацеї, спостерігалися висипання на шкірі, свербіж, крапив'янка, збудження, порушення сну, у поодиноких випадках – набряк обличчя, утруднене дихання (задишка), запаморочення та зниження артеріального тиску.

У поодиноких випадках можуть виникати реакції гіперчутливості, такі як шкірні реакції та гарячка після застосування препаратів, що містять хінін або хінідин.

### **Передозування.**

Можливе посилення проявів побічних реакцій. При застосуванні високих доз препарату можливе виникнення нудоти, блювання, діареї, бессоння, підвищеного збудження.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Не застосовувати у період вагітності або годування груддю.

### **Діти.**

Препарат рекомендований для лікування дітей віком від 12 років.

### **Особливості застосування.**

Відсутні.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Враховуючи, що у чутливих хворих при застосуванні препарату можуть виникнути побічні реакції (запаморочення, зниження артеріального тиску), на даний період слід утримуватися від керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Унаслідок імуностимулюючої дії ехінацея може зменшувати ефективність препаратів, які чинять імунодепресивну дію. Препарат не рекомендується застосовувати одночасно з препаратами з гепатотоксичною дією, такими як аміодарон, метотрексат, кетаконазол, стероїдні препарати.

### **Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.** Препарат метаболічної, протизапальної, знеболювальної, протиревматичної, діуретичної, антисептичної дії. Дія препарату базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу препарату.

### **Фармацевтичні характеристики.**

**Основні фізико-хімічні властивості:** прозорий безбарвний розчин без запаху.

### **Несумісність.**

Невідома.

### **Термін придатності.** 5 років.

### **Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка.**

5 ампул та 50 (5x10) ампул по 2,0 мл у картонній коробці.

### **Категорія відпуску.** За рецептром.

### **Виробник.**

Біологіше Хайліміттель Хеель ГмбХ.

Biologische Heilmittel Heel GmbH.

### **Місцезнаходження.**

Д-р Рекевег-штрасе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germanv.

### **Дата останнього перегляду.**

Узгоджено з матеріалами реєстраційного досьє та достовірно відомими даними щодо застосування лікарського засобу