



**Состав:** диоксид кремния, микрокристаллическая целлюлоза.

**Дата изготовления и срок годности:** дата изготовления указана на упаковке.

**Срок годности** – 3 года от даты изготовления.

**Условия хранения:** хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 0С до 25С и относительной влажности воздуха не больше 75%. Готовую суспензию хранить в плотно закрытом флаконе при температуре (4+-2)С не больше 32 часов.

**Рекомендации относительно потребления:** рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник энтеросорбентов с целью профилактики и ослабления симптомов при пищевых отравлениях разного происхождения (в т.ч. грибами и алкоголем), острых кишечных инфекциях, желудочных расстройствах, гепатитах (в т.ч. вирусных гепатитах А и В), почечной и печеночной недостаточности, аллергических заболеваниях, дерматитах, эндогенной интоксикации, дисбактериозе. Способствует адсорбции из желудочно-кишечного тракта и выведению из организма экзо- и эндогенных токсических веществ разного происхождения (в т.ч. продуктов жизнедеятельности патогенных микроорганизмов, пищевых и бактериальных аллергенов). Опосредованно способствует уменьшению проявлений токсико-аллергических реакций, снижению метаболической нагрузки на органы детоксикации (в первую очередь – печень и почки), коррекции обменных процессов и иммунного статуса, устранению дисбаланса биологически активных веществ в организме, усиливает перистальтику кишечника.

**Способ применения и рекомендуемая суточная доза:** флакон с порошком открывают, добавляют кипяченую воду, охлажденную до комнатной температуры, к горлышку (250 мл) и тщательно взбалтывают до образования однородной суспензии (один мерный колпачок суспензии содержит 1,15 г диоксида кремния). Употреблять взрослым и детям в возрасте от 1 года и старше: взрослым и детям в возрасте от 7 лет и старше – по 2 мерных колпачка суспензии (50 мл) 3-4 раза в сутки в промежутках между

Возраст ребенка	Средний вес ребенка	Средняя разовая доза, мерных колпачков	Средняя суточная доза, мерных колпачков
1-2 года	9-12 кг	Половина мерного колпачка	Полтора мерных колпачка
3-4 года	14-16 кг	Один мерный колпачок	Три мерных колпачка
5-6 лет	18-20 кг	Полтора мерных колпачка	Четыре с половиной мерных колпачка

приемами пищи.

Курс потребления определяет врач индивидуально.

**Особенности применения:** суспензию употреблять не раньше, чем за 1 час до приема пищи.

**Предостережение относительно потребления пищевого продукта определенными категориями населения (детьми, беременными женщинами, пожилыми людьми, спортсменами и аллергиками):** перед применением необходимая консультация врача.

**Противопоказания:** индивидуальная невосприимчивость компонентов, беременность и период лактации, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения, язвы и эрозии слизистой оболочки кишечника, желудочные и кишечные кровотечения, кишечная непроходимость.

Добавка диетическая.

Не является лекарственным средством.

**Форма выпуска:** порошок.

**Масса нетто, г:** 12+-0,5.

**Название (наименование), полный адрес и телефон производителя:** Украина, ООО "ОмниФарма Киев", 02088, г. Киев, ул. Ленина, 55, тел.: (044) 577-57-37 (38,39); [www.omnifarma.kiev.ua](http://www.omnifarma.kiev.ua)

**Адрес мощностей объекта производства (местонахождение):** 20741, Черкасская обл., Смелянский р-н, с. Сунки, ул. Ленина, 1

**TU U 15.8-33082808-001:2008**

**Штрих-код:** указан на упаковке



**Склад:** діоксид кремнію, мікрокристалічна целюлоза.

**Дата виготовлення та строк придатності:** дата виготовлення вказано на упаковці.

**Строк придатності** - 3 роки з дати виготовлення.

**Умови зберігання:** зберігати в сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці при температурі від 0С до 25С та відносній вологості повітря не більше 75%. Готову суспензію зберігати у щільно закритому флаконі при температурі (4 + -2) С не більше 32 годин.

**Рекомендації щодо споживання:** рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело ентеросорбентів з метою профілактики та пом'якшення перебігу при харчових отруєннях різного походження (в т.ч. грибами та алкоголем), гострих кишкових інфекціях, шлункових розладах, гепатитах (в т.ч. вірусних гепатитах А і В), нирковій та печінковій недостатності, алергічних захворюваннях, дерматитах, ендогенній інтоксикації, дисбактеріозі. Сприяє адсорбції з шлунково-кишкового тракту і виведенню з організму екзо-та ендогенних токсичних речовин різного походження (в т.ч. продуктів життєдіяльності патогенних мікроорганізмів, харчових та бактеріальних алергенів). Опосередковано сприяє послабленню токсико-алергічних реакцій, зниженню метаболічного навантаження на органи детоксикації (в першу чергу - печінку і нирки), корекції обмінних процесів і імунного статусу, усуненню дисбалансу біологічно активних речовин в організмі, посилює перистальтику кишечника.

**Спосіб застосування та рекомендована добова доза:** флакон з порошком відкривають, додають кип'ячену воду, охолоджену до кімнатної температури, до горлечка (250 мл) і ретельно збовтують до утворення однорідної суспензії (один мірний ковпачок суспензії містить 1,15 г діоксиду кремнію). *Вживати дорослим і дітям віком від 1 року і старше: дорослим і дітям віком від 7 років і старше - по 2 мірних ковпачка суспензії (50 мл) 3-4 рази на добу в проміжках між прийомами їжі.*

Курс споживання визначає лікар індивідуально.

**Особливості застосування:** суспензію вживати

Вік дитини	Середня вага дитини	Середня разова доза мірних ковпачків	Середня разова доза мірних ковпачків
1-2 роки	9-12 кг	Половина мірного ковпачка	Півтора мірних ковпачка
3-4 роки	14-16 кг	Один мірний ковпачок	Три мірних ковпачка
5-6 років	18-20 кг	Півтора мірних ковпачка	Чотири з половиною мірних ковпачка

не раніше, ніж за 1 годину до прийому їжі.

**Застереження щодо споживання (дітьми, вагітними жінками, літніми людьми, спортсменами та алергіками):** перед застосуванням необхідна консультація лікаря.

**Протипоказання:** індивідуальна несприйнятливості компонентів, вагітність та період лактації, виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки у стадії загострення, виразки та ерозії слизової оболонки кишечника, шлункові та кишкові кровотечі, кишкова непрохідність.

Добавка дієтична.

Не є лікарським засобом.

**Форма випуску:** порошок.

**Маса нетто, г:** 12 + -0,5.

**Назва (найменування), та повна адреса і телефон виробника:** Україна, ТОВ "ОмніФарма Київ", 02088, м. Київ, вул. Леніна, 55, тел.: (044) 577-57-37 (38,39); [www.omnifarma.kiev.ua](http://www.omnifarma.kiev.ua)

**Адреса потужностей об'єкта виробництва:** 20741, Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Сунки, вул. Леніна, 1

**ТУ У 15.8-33082808-001:2008**

**Штрих-код:** вказано на упаковці